



Red Fitosanitaria de Aragón
Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 19

MAYO de 2025

OLIVAR

ESTADO FENOLÓGICO

Fenología

Los estados predominantes son **DI** y **DII** y ya se encuentran zonas con el estado **E**.



DI Predomina la corola

DII La corola cambia de color

E Se aprecian los estambres

ABICHADO (*Euzophera pingüis*).

Se están observando pocas capturas en las trampas. Cuando se alcance el máximo de vuelo, observar los troncos donde se ven los excrementos que deja la larva al entrar en el tronco. Especial atención en las plantaciones jóvenes.



Excrementos en tronco

BARRENILLO DEL OLIVO (*Phloeotribus scarabaeoides*)

En estas semanas se están dando los máximos de entradas de barrenillos en los troncos cebo, es necesario tener los restos de poda hasta mediados de mayo, para que entren el mayor numero posible de barrenillos

Para quemar los restos de poda, hay que hacerlo con el perfecto permiso y que el mapa de *indice de riesgo por uso de fuego* lo permita, antes del 31 de mayo. En caso de triturar los resto se puede hacer durante el mes de junio.



Tronco con entrada de Barrenillo

BARRENILLO NEGRO (*Hylesinus oleiperda*)

En esta semana el estado evolutivo del barrenillo negro es pupa ya se esta transformando en adulto



Pupa

PRAYS ANTOFAGA (*Prays oleae*).

La captura de Prays a alcanzado el maximo en esta semana, por lo tanto las hembras estan depositando los huevos en las inflorescencias. Esta generaci3n no suele ser necesario tratarla ya que la floraci3n del olivo es muy abundante y el da1o no es significativo.



Larva de prays comiendo flores

REPILO (*Fusicladium oleagineum*)

Esta semana se ha realizado el control de repilo primavera y los niveles de infectación han salido altos, como era de esperar por las condiciones climáticas que hemos tenido estas fechas, se ha dado aviso de tratamiento en todas las comarcas olivereras de Aragón.



Repilo visible